

Contexte du diabète de type 2 pendant la pandémie de COVID-19

Un sondage récent a révélé que plus de la moitié des diabétiques (DT2) au Canada (56 %) ne connaissent pas les Lignes directrices de pratique clinique publiées par Diabète Canada*.

Au Canada, les 551 personnes ayant participé au sondage affirment avoir reçu un **diagnostic de diabète de type 2** posé par un professionnel de la santé.




61,7 %



38,3 %

24 %
Aînés
(74 ans et plus)



10,2 %
Génération X
(39 à 54 ans)

65,5 %
Bébés-boumeurs
(55 à 73 ans)

Représentation des diabétiques (DT2) au Canada :

Parmi les patients, **26 %** ont récemment eu des difficultés à maîtriser leur glycémie, notamment pour les aspects suivants :

- Accès à l'équipe de soins de santé (89 %)
- Saine alimentation (43 %)
- Maintien d'un mode de vie sain (33 %)
- Autosurveillance adéquate (29 %)

Parmi les patients, **93 %** tentent de s'informer à propos de leur maladie :

- Médecin (80 %)
- Personnel infirmier spécialisé dans l'éducation sur le diabète (27 %)
- Pharmacien (18 %)
- Recherche en ligne (17 %)

Au Canada, **35 %** des diabétiques (DT2) ont posé des questions à leur équipe de soins de santé (médecin, infirmière et/ou pharmacien) à propos de nouveaux traitements.

Au Canada, **65 %** des diabétiques (DT2) n'ont pas posé de questions à leur équipe de soins (médecin, infirmière et/ou pharmacien) à propos de nouveaux traitements.

Au Canada, **62 %** des diabétiques (DT2) se montrent intéressés par tout nouveau traitement que leur médecin pourrait recommander.

Les bébé-boumeurs sont plus susceptibles de trouver difficile (61 %) ou anxiogène (72 %) de commencer un nouveau traitement pendant la pandémie de COVID-19, en raison de l'accès limité aux médecins et pharmaciens.

Si vous-même ou une personne que vous connaissez avez le diabète de type 2, et avez besoin d'information ou de soutien, veuillez consulter Diabetes.ca ou DiabetesCareCommunity.ca.

Sondage en ligne auprès de diabétiques (DT2) confirmés au Canada réalisé du 20 au 26 mai 2020 par le biais de la table ronde en ligne de consommateurs canadiens Maru/Blue. La marge d'erreur de cette étude est de +/-2,5 %, 9 fois sur 10.

* Les Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada visent à orienter la pratique; à informer sur les tendances générales de soins; à améliorer les mesures de prévention du diabète au Canada; et à réduire le fardeau des complications du diabète. <http://guidelines.diabetes.ca/ressourcesfrancaises>